

需使用輸液幫浦之高警訊藥物用藥指導單張

學名：**Sodium chloride**
商品名：**3% Sodium Chloride injection, 500mL**
中文名：**3%氯化鈉注射液**



一、適應症

鈉及氯離子之補充（用以提高血清中鈉及氯離子之濃度）安迪生氏危象及糖尿病性昏迷。

二、此藥品該如何使用？(※本藥為需使用輸液幫浦之高警訊藥物)

(按病人情況及製劑而使用各種濃度製劑)

1.0.9%溶液—24小時1.5～3公升。

2.0.45%溶液—24小時2～4公升。

3.3%或5%溶液—輸注速度勿超過100ml/hr。

三、劑量及相關使用注意事項

- 1.應監測電解質血中濃度(Na^+)。
- 2.應使用較大靜脈血管。
- 3.有下列疾患者應慎重投藥：心臟疾患、高血壓症、腎機能不良者，末梢及肺浮腫患者以及妊娠中毒者。**(滴注較高張濃度的溶液要很慢，以防止肺水腫)**
- 4.本品呈鹼性，若與其他注射藥混合時，易起配合變化，需注意。

四、此藥會造成什麼副作用？

過量投與會導致高血鈉症，器官脫水。

諮詢電話：07-7613111 轉 1119

杏和醫院 藥劑科關心您