

用藥指導單張

成分名：**Warfarin**

商品名：**Cofarin Tablets 1mg**

中文名：可化凝錠 1 公絲



一、作用

抗凝血劑，可以用於治療或預防血栓形成。

二、用法

1. 本藥須由醫師處方，請遵照醫囑使用，未經醫師指示，切勿自行驟然更改劑量或停藥。
詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量及醫師的指示。

三、注意事項

1. 服藥期間請一定要主動告知您的醫師及牙醫您正在接受抗凝血藥物的治療。
2. 服藥期間請一定要遵照醫師指示定期監測及執行PT（凝血酶原）或INR 等抽血檢驗，以確認藥物在合適的劑量範圍並確保您的用藥安全。
3. 若您近期將接受手術或抽血檢查時請詳詢您的醫師是否需暫時停藥。
4. 請避免讓自己受傷，盡量使用軟毛牙刷或安全的電動刮鬍刀。
5. 若您正計劃使用或停用任何藥物時，請一定先告知並諮詢您的醫師或藥師。
6. 飲食習慣應保持固定，勿隨意增減，若有任何改變請於回診時告知醫師。
7. 富含維生素K食物（例如：綠茶、肝臟、深綠色蔬菜如甘藍菜、菠菜、花椰菜、芥藍、無菁菜、蘆筍、甜菜等）會影響Warfarin藥效，不要突然增減用量，請適量攝取。
8. 過度飲酒（每日大於2~3 杯啤酒）、大量攝取豆類製品或烹煮過的洋蔥、每日攝取大於400IU的維生素E，皆可能加強warfarin 的藥效，請勿大量攝取。
9. 中草藥或保健食品（例如：輔酶Q10、人參、聖約翰草、大蒜精、當歸、丹參、銀杏等）可能會影響Warfarin藥效，未經醫師許可，不可自行使用。

四、忘記用藥的處置

1. 想起時應立即服藥；若已接近或已到下次用藥時間，則只需服用下一次劑量，絕不可一次服用雙倍劑量。
2. 如不清楚如何處置，請洽詢醫師或藥師。

五、可能的副作用

1. 當使用一般治療劑量時，warfarin 很少會發生副作用，因此當您出現以下疑似此藥造成的不良反應時，請立即就醫：
異常出血（血便或黑便、血尿、咳血或褐色物質、經血量過多、牙齦出血、割傷後長時間才止血）或大面積瘀傷、不明原因的發燒、腹痛或腹瀉。
2. 若您於服藥期間持續發生下述狀況時請聯絡您的醫師或藥師並於回診時主動告知醫師：
不明原因且持續性地出現頭暈、疲倦、皮疹或搔癢、食慾不振、胃腸不適、手 腳麻木、臉部麻痺、

噁心或嘔吐等症狀。

六、保存方式

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
2. 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤服。

資料來源：藥品仿單。