

需使用輸液幫浦之高警訊藥物用藥指導單張

學 名： Amiodarone

商品名： Cordarone 150mg/3mL

中文名： 臙得樂注射液



一、適應症

短期使用治療心室纖維顫動、WOLFF-PARKINSON-WHITE氏症候群、上室性及心室性心搏過速、心房撲動心房纖維顫動。

二、此藥品該如何使用？(※本藥為需使用輸液幫浦之高警訊藥物)

起始劑量：按每公斤體重給予5mg計算，溶解於葡萄糖溶液中。若可能的話，請使用電動注射器，在20分鐘至2小時時間內靜脈輸注給藥，可每24小時重複輸注二至三次。維持劑量：日劑量一般依體重1.-20mg/kg計算(通常600至800/24小時，至多1.2g/24小時)，配以250ml葡萄糖溶液輸注數天。

三、劑量及相關使用注意事項

- 1.心搏過慢者與房室傳導阻礙者不宜使用。
- 2.對碘過敏者，有甲狀腺疾病者亦宜避免使用。
- 3.由於副作用很大，因此在其他藥品無法使用後，才可考慮使用。
- 4.劑量超過5mg/kg時，嚴重心機能不全、嚴重呼吸不全、動脈壓下降的患者，應小心使用。
- 5.使用期間，避免直接曝曬在陽光下，並應隨時觀察血壓變化。
- 6.有時患者使用本藥後，接近瞳孔眼角膜兩旁會有細小黃褐色沈澱物，此時，只要停止用藥或降低劑量，就會消失。
- 7 電解質障礙，特別是低血鉀症:應注意病人是否有和低血鉀症相關聯的電解質障礙，低血鉀症可能會誘發致心律不整效應。 在給予

amiodarone

之前應先校正病人之低血鉀症。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D級：

五、此藥會造成什麼副作用？

熱潮紅、盜汗、噁心、掉頭髮。引起中度和短暫性之血壓降低。

諮詢電話：07-7613111 轉 1119

杏和醫院 藥劑科關心您