

需使用輸液幫浦之高警訊藥物用藥指導單張

學 名： DOPAMIN 40MG/ML 5ML

商品名： DOPAMIN INJ 200MG 5 ML

中文名： 得保命注射液



一、適應症

休克症候群及心臟衰竭。

二、此藥品該如何使用？(※本藥為需使用輸液幫浦之高警訊藥物)

本品不得直接皮下，肌肉或直接靜脈注射。需以5%葡萄糖液或生理食鹽水稀釋後靜脈點滴靜注。初劑量速率為每分鐘2~5 μ g/kg，而後視病人之血壓，心輸出量，尿量而漸增速率每分鐘1~10 μ g/kg遇嚴重之病情，若需要時可增至每分鐘速率20~50 μ g/kg(最多為50 μ g)。

三、劑量及相關使用注意事項

- 1.注射時需監測心電圖和血壓。
- 2.使用前先稀釋溶液。
- 3.勿添加鹼性靜注溶液 (如 NaHCO_3 等鹼性藥物)。
- 4.在輸液期間仔細監測血壓，脈搏，心排出量，利尿流量，流速一定要調整好以維持穩定的生命徵象。
- 5.若使用高劑量，要連續測定尿排出量，若排出量開始降低，則應減少劑量。
- 6.注意皮膚顏色及溫度或注射部位的堅實，若有任何變化表示可能外滲，以含 phentolamine(5~10mg)之 10~15ml 生理食鹽水浸潤以預防壞死。
- 7.注意過量之症狀：高血壓、尿流量減少，不整脈，四肢顏色改變並減少劑量，通常不需解毒處置，因作用時間很短。
- 8.檢查輸液系統維持穩定的流速，視需要調整以獲得所需的血流動力和腎的反應。
- 9.輸液到大靜脈(最好肘前窩)以減少外滲和組織壞死之危險。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C級：

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、心悸、心跳過速、稍低血壓、中等程度的呼吸困難。

諮詢電話：07-7613111 轉 1119

杏和醫院 藥劑科關心您