

需使用輸液幫浦之高警訊藥物用藥指導單張

學 名： Dobutamine

商品名： GENDOBU 250MG

中文名： 健多博注射液



一、適應症

增強心肌收縮力而適用於短期治療器質性心臟病、心臟外科手術引起 心肌收縮力抑制而導致之心臟代償機能衰竭。

二、此藥品該如何使用？(※本藥為需使用輸液幫浦之高警訊藥物)

對大多數病人而言，用以增加心搏出量的灌注速度為每分鐘2.5～10mcg/kg。通常欲改善血流狀況必須施以超過每分鐘20mcg/kg的劑量。極少的情況下曾有灌注速度超過每分鐘40mcg/kg。可高至5000mg/L(250mg/50mL)。使用治療建議漸漸減低用量，而不驟然停藥。

三、劑量及相關使用注意事項

1. 與其他注射劑型的catecholamine一樣，投予dobutamine HCl時必須仔細 檢查心跳速度及節奏，動脈壓及注入的速度。當最初投藥時，最好以心電圖做監視直到穩定為止。
2. 投與dobutamine HCl前必須先校正血容靜積減少現象。(若有血溶積不足，須先以適當的容積補充劑矯治)
3. 若同時服用 β -擬交感神經接受器拮抗劑時，dobutamine HCl的效價可能降低。
4. 對孕婦與兒童之安全性亦未確定，宜避免使用。
5. 本品不能用鹼性溶液(如碳酸氫鈉)稀釋。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B級：

五、此藥會造成什麼副作用？

增加心跳，血壓及心室異位活性。

諮詢電話：07-7613111 轉 1119

杏和醫院 藥劑科關心您