

用藥指導單張

學名：Heparin

商品名：▲HEPAC INJECTION 5000U/ML/5ML

中文名：海派注射液



一、此藥品的用途是什麼？

血栓性栓塞症及其預防，抗凝血，或其它臨床用途

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

抗凝血治療除非醫師另有規定，用量視實際臨床情況及循環系統抗凝血酵素的濃度而定，在治療時須考慮到對 Heparin Sodium 的各種感受性及容忍性。假如總藥劑靜脈注射 40000 i.u. 及繼續用藥超過 24 小時，則每小時用藥量為 1700 i.u.，做間歇性 Heparin Sodium 靜脈注射時，應該每 4 小時注射一次，因其半衰期很短。皮下注射 Heparin Sodium 治療則用量減半，並每隔 12 小時打一次。通常治療上要以其凝血酵素時間，超過原來的數值 2~3 倍為治療的參考依據。

三、使用時我該注意的特別事項？

使用 Heparin 須格外小心，它可能增加出血之傾向。使用 Heparin 治療，照規定應常作凝血試驗，假如凝血試驗有過度延長或出血現象發生，應即刻停止投與。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

出血，過敏反應（冷顫、蕁麻疹、發燒、鼻炎、氣喘樣的反應），急性可逆性血小板過少症，禿頭，骨稀鬆病、腎功能受損，SC 和 IM 注射部位局部刺激。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

藥物諮詢專線：07-7613111 轉 1119

杏和醫院 藥劑科關心您