

需使用輸液幫浦之高警訊藥物用藥指導單張

學名：**Potassium Chloride**
商品名：**15% KCl Injection 20mL**
(1.5g/10mL; 2mEq/mL)
中文名：**氯化鉀注射液**



一、適應症

鉀缺乏症的預防及補給。

二、此藥品該如何使用？(※本藥為需使用輸液幫浦之高警訊藥物)

- 成人：
血鉀 $>2.5\text{mEq/L}$ ：不超過 10mEq/hr ，每日可使用 200 mEq K+
血鉀 $<2.5\text{mEq/L}$ ：不超過 40mEq/hr ，每日可使用 400 mEq K+
- 孩童：
每日可以使用到 3mEq/kg 或 40mEq/m^2 的 K+ ，投與的輸注液體積依身體大小調整。

三、劑量及相關使用注意事項

- 靜脈投與前必須稀釋，若直接注射，病人可能立即死亡。
- 不可使用於尿少症患者。
- 嚴重腎臟疾病、Addison 氏病、急性脫水中暑性痙攣、高血鉀症，不可使用本藥。
- 使用本藥須監測病人血鉀濃度及心電圖。
- 交互作用：
(1)與ACE抑制劑併用時可能引起高血鉀症。
(2)與保鉀利尿劑併用時，可能引起嚴重高血鉀症及心律不整與心跳停止。

四、此藥會造成什麼副作用？

- 高血鉀症:四肢感覺異常、鬆弛性麻痺、反射消失、無力感、無精打采、精神紊亂、腿無力、低血壓、心律不整、心跳停止與心電圖異常。
- 其它:噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉。

諮詢電話：07-7613111 轉 1119

杏和醫院 藥劑科關心您