

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG PAXLOVID™ QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY

1. Paxlovid™ chưa được cấp phép đăng ký lưu hành chính thức tại Việt Nam (có hiệu lực tại thời điểm này cho EUA), sử dụng dẫn độ chông qua ống thông).
2. Lưu ý: Sử dụng hỗn dịch qua ống thông chưa được đánh giá lâm sàng.. Paxlovid™ dạng viên, chưa đủ tiện quản ăm thông nhốcy khi sử dụng rã ống thông.

⚠ Chuẩn bị và Lưu ý khi sử dụng qua ống thông



- Kích thước ống thông: Sử dụng ống 8FR hoặc lớn hơn; PVC, silicone hoặc polyurethane
- Chuẩn bị ống tiêm 20 ml (vòi A & vòi B)



Chuẩn bị hai loại thuốc (Nirmatrelvir, Ritonavir) trong các hỗn dịch riêng biệt. Dùng cách nhau trong vòng 5 phút.



Hỗn dịch bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 4 giờ. Không dùng quá thời gian bảo quản này.



Uống Paxlovid (Nirmatrelvir/Ritonavir) ít nhất 2 giờ trước hoặc sau khi ăn bất kỳ thực phẩm nào.

⚠ Các bước chuẩn bị

1

2

Hỗn dịch voăm

3

Ống brăn nhanh bàn dua



Tham khảo: Dữ liệu của Pfizer



Nirmatrelvir 150 mg
(2 viên màu hồng)



Ritonavir 100 mg
(1 viên màu trắng)

錠劑

trong

vòi A



Vòi A

15 ml

10 ml

磨粉

trong

vòi B



Vòi B

15 ml

10 ml

Thực hiện theo các bước sau cho mỗi ống tiêm:

1. Thêm 10 ml nước vào vòi. Rút không khí lên 15 ml.
2. Lắc lên xuống trong 15 giây, sau đó để yên trong 3 phút để hòa tan hoàn toàn.



Lưu ý quan trọng: KHÔNG TRỘN lẫn hai loại thuốc, cách nhau 5 phút.

1. Lắc đều trong 1 phút để đảm bảo trộn kỹ.
2. Sau khi dùng thuốc, thêm 10 ml nước, lắc lên xuống trong 15 giây để rửa sạch và đảm bảo ống thông dạ dày được làm sạch hoàn toàn.

Tài liệu này là hướng dẫn quy trình đơn giản, để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ.