

用藥指導-COVID-19 治療口服抗病毒藥品 Paxlovid

- 商品名：Paxlovid
- 成分含量：Nirmatrelvir 150 mg 2 錠與 Ritonavir 100 mg 1 錠
- 藥品外觀：
 - Nirmatrelvir 150 mg 錠劑為橢圓形、粉紅色速放膜衣錠，一側 PFE 字樣，一側刻 3CL 字樣。
 - Ritonavir 100 mg 錠劑為白色橢圓形膜衣錠，一側刻 H 字樣和一側刻 R9。
- 適用對象：適用於發病 5 天內、具有重症風險因子之成人與兒童病人(12 歲以上且體重至少 40 公斤)的輕度至中度新型冠狀病毒疾病(COVID-19)確診者。

用法與劑量

- Paxlovid 是 Nirmatrelvir 與 Ritonavir 2 種藥物組成，每天口服 2 次（早上和晚上），每次劑量主要「2 顆粉紅色」和「1 顆白色錠劑」，需要同時服用 3 顆錠劑且持續 5 天。
- 可與食物併服或不併服。需要整顆吞服，不要咀嚼、分開或壓碎錠劑。未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。
- 若忘記服藥在平常服用的 8 小時內服一劑，請盡快服用。如果超過 8 小時才想起請略過，從下個劑量繼續按時使用，不可服用雙倍劑量。
- 腎功能不佳的病人請依醫師指示需要減量服用。



接受治療優缺點

- 臨床試驗顯示使用前述口服抗病毒藥物可能有助於縮短病程、減輕疾病嚴重度與降低死亡率，但藥物效果並非百分之百，您也可能在接受治療症狀惡化，或出現新的症狀。

藥品存放方式

- 請連同藥袋存放於緊密容器內，於室溫下、乾燥處，避光保存，建議置於排裝包裝內至需用時再取用。避免放在孩童容易取得的地方。

可能的不良反應

- 食慾不振、皮膚和眼白變黃（黃疸）、深色尿液、淺色糞便和皮膚搔癢，胃部（腹部）疼痛。
- 其他可能副作用：味覺改變(苦味)、腹瀉、血壓升高、肌肉疼痛。

注意事項

- 如果您正在服用含 ritonavir 或 cobicistat 的藥物來治療 C 型肝炎或人類免疫缺陷病毒，應按照指示繼續接受治療。
- 對 Paxlovid 中的任何成分過敏請勿服用。
- 因本藥與其他藥物有許多交互作用，會增加或減少多種其他藥物的濃度，請務必主動告訴您的醫療團隊，提供者您正在使用的所有藥物。若於治療期間需使用其他藥物，請主動告知醫師或諮詢藥師。

其他注意事項

- 為確保療效，若症狀輕微請勿停藥。
- 現有的 paxlovid 臨床資料相當有限，可能會發生先前使用 paxlovid 時未曾通報的嚴重與非預期的不良事件，如果有任何困擾您或持續未緩解的副作用，請告知醫師或諮詢藥師。