

用藥指導單張

學 名： Clopidogrel

商品名： PLAVIX 75MG

中文名： 保栓通錠



一、此藥品的用途是什麼？

降低近期發生中風、心肌梗塞或週邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化病人之粥狀動脈硬化事件(如:心肌梗塞、中風或其他因血管病變引起死亡)的發生。與ASPIRIN併用降低非ST段上升之急性冠心症(不穩定性心絞痛和非Q波型心肌梗塞)病人之粥狀動脈栓塞事件。

二、此藥品該如何使用？

1. 成人：Clopidogrel的建議劑量為每天75mg，一天一次，可和食物併用或分開使用。

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 和其他抗血小板製劑一樣，Clopidogrel應小心使用於可能有出血危險的病人(如：創傷、手術或其他病理狀況的病人)。若病人選擇手術治療且不希望手術期間有抗血小板作用者，應於手術前7天停止使用Clopidogrel。Clopidogrel會延長出血時間，應小心使用於罹患可能病發流血病變的病人(特別是胃腸道和眼內出血的病人)。 2. 服用Clopidogrel的病人應被告知當受傷時，傷口止血所需要的時間可能會比平常更長一點，若發現任何不正常出血狀況時，應立即看醫師。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：

五、此藥會造成什麼副作用？

出血：最常被報告的出血事件為紫癍/瘀血和鼻出血(epistaxis)，其他較少被報告的出血事件為血腫、血尿、眼睛出血(主要是結膜部位出血)。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

諮詢電話：07-7613111 轉 1119

杏和醫院 藥劑科關心您