

用藥指導單張

學 名：Dabigatran

商品名：Pradaxa capsules 110mg

中文名：普栓達膠囊110毫克



一、此藥品的用途是什麼？

1. 用於靜脈血栓高危險群病人，以預防其於接受下肢重大骨科手術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)。
2. 預防非瓣膜性心房纖維顫動病人發生中風與全身性栓塞。
3. 治療成人急性深層靜脈血栓(DVT)及/或肺栓塞(PE)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 用於靜脈血栓高危險群病人，以預防其於接受下肢重大骨科手術後之靜脈血栓栓塞症(VTE):
建議使用劑量為每次口服150mg(兩顆75mg)或220mg(兩顆110mg)，一天一次。治療應於手術結束後1-4小時內開始(口服一顆膠囊)。隨後每次服用2顆膠囊，一天一次，總計10天(膝關節置換手術)或28-35天(髖關節置換術)。
2. 預防非瓣膜性心房纖維顫動病人發生中風與全身性栓塞:
建議使用劑量為110-150mg，一天兩次，空腹或飯後服用均可。
3. 治療成人急性深層靜脈血栓(DVT)及/或肺栓塞(PE):
建議於注射型抗凝血劑治療至少5天之後，使用一天300mg劑量的Pradaxa(每次口服150mg，一天兩次)，持續治療6個月。

※若忘記服藥：

1. 距離原定的下一劑時間至少6小時，則補服一劑。
2. 距離原定的下一劑時間不足6小時，跳過本劑，直接於原定服藥時間，服用下一劑。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：

在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本品會增加出血風險而且可能造成嚴重或致命出血，應審慎評估病患出血症狀/徵兆，追蹤血紅素等試驗檢查，當有進行性病理出血時應停用本品。

藥物諮詢專線:07-7613111 轉 1119

杏和醫院 藥劑科關心您