

用藥指導單張

學名：Dulaglutide 1.5mg/0.5ml/single dose pen

商品名：Trulicity inj 1.5mg/0.5ml

中文名：易週糖®注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

第2型糖尿病

二、此藥品該如何使用？

1. 每週注射一次易週糖®，可在一天當中的任何時間給藥，不須考慮進食與否，以皮下注射方式輪流注射在腹部、大腿或上臂。

2. 若有需要，可以改變每週給藥的日子，但前後兩劑之間隔必須為3日以上。根據病人的需要，由醫師決定劑量。

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量及醫師的指示。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 易週糖® 禁用於個人或是家族有甲狀腺髓質癌病史患者及第2型多發性內分泌腫瘤綜合症患者。

2. 若與磺醯尿素類降血糖藥或胰島素併用發生低血糖，請告知醫師。

3. 與胰島素併用時，要分開施打，千萬不要混和兩種藥品。

4. 使用後之注射筆內因含針頭，請置於密閉容器帶回醫院丟棄。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：

表示動物實驗顯示對胎兒有危害，但缺乏控制良好的孕婦實驗，或者缺乏動物實驗或孕婦實驗數據。在這種情況下，醫師會評估用藥的必要性和潛在風險，並在用藥效益大於風險時才考慮使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

可能有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、食慾減低等。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 本藥需放在原包裝盒內避光冷藏(2-8°C)，不可冷凍！如發生變質或過期，不可再使用。

2. 若有需要，注射筆可放在不超過攝氏30度的避光環境，最多存放14天。


七、注射操作說明

開始注射前


1. 將藥物自冰箱取出，請保持基座蓋蓋著。
2. 核對藥物正確並確認效期。
3. 檢查注射筆外觀完整並確認藥物無混濁或異物。
4. 清洗雙手。

選擇注射部位

可將藥物注射於腹部或大腿
由他人協助時可注射於上臂



藥品構造




注射步驟

1. 確認注射筆上鎖，垂直向下取下基座蓋，請勿再將基座蓋蓋回。
2. 將藥物透明基座平放在注射部位，並緊壓皮膚。旋轉上鎖環來解鎖。



3. 按住綠色注射鈕；會先聽見一次響亮喀聲，持續將藥物透明基座緊貼皮膚直到第二次聽見喀聲，可目視藥物透明視窗，看到灰色活塞表示已完成注射，注射完成後可將注射筆從皮膚移開。



資料來源：

1. 衛生福利部食品藥物管理署. 衛部菌疫輸字第 000978 號. 許可證詳細內容. Retrieved July 19, 2022, from <https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=60000978>
2. 台灣禮來股份有限公司. (2020, May 25). Trulicity-用藥指引-109-05-25. 仿單資料. Retrieved July 19, 2022, from <https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D3.aspx?LicId=60000978>
3. 台灣禮來股份有限公司. (2020, May 25). Trulicity-仿單 revised-109-05-25. 仿單資料. Retrieved July 19, 2022, from <https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D3.aspx?LicId=60000978>
4. 台灣禮來股份有限公司. (2019, June 28). TRULICITY 1.5mg-使用手冊 201905-108-06-28. 仿單資料. Retrieved July 19, 2022, from <https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D3.aspx?LicId=60000978>

諮詢電話：07-7613111 轉 1119
杏和醫院 藥劑科關心您