

用藥指導單張

學名：Dulaglutide

商品名：Trulicity inj 1.5mg/0.5mL

中文名：易週糖®注射劑

一、作用

第二型糖尿病。

二、用法

1. 每週皮下注射一次，可在一天當中的任何時間給藥，不論是否進食。

2. 本藥須由醫師處方，請遵照醫囑使用。

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量及醫師的指示。



三、注意事項

1. 計畫懷孕、已懷孕或哺乳期間，請告知醫師。
2. 本身或家族有甲狀腺髓質癌病史，或罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群的病人，請勿使用此藥。
3. 若與磺醯尿素類降血糖藥或胰島素併用發生低血糖，請告知醫師。
4. 與胰島素併用時，要分開施打，千萬不要混和兩種藥品。
5. 使用後之注射筆內因含針頭，請置於密閉容器帶回醫院丟棄。

四、注射操作說明

開始注射前


1. 將藥物自冰箱取出，請保持基座蓋蓋著。
2. 核對藥物正確並確認效期。
3. 檢查注射筆外觀完整並確認藥物無混濁或異物。
4. 清洗雙手。

藥品構造



選擇注射部位


可將藥物注射於**腹部**或**大腿**
由他人協助時可注射於**上臂**




注射步驟

1. 確認注射筆上鎖，垂直向下取下基座蓋，請勿再將基座蓋蓋回。
2. 將藥物透明基座平放在注射部位，並緊壓皮膚。旋轉上鎖環來解鎖。

①





②



3. 按住綠色注射鈕；會先聽見一次響亮喀聲，持續將藥物透明基座緊貼皮膚直到第二次聽見喀聲，可目視藥物透明視窗，看到灰色活塞表示已完成注射，注射完成後可將注射筆從皮膚移開。

③



當看到灰色活塞，表示
您已正確完成注射。

五、忘記用藥的處置

1. 若錯過一劑藥物，應在 **4 天(96小時)內**儘快施打。
2. 必要時可改變每週注射的日期，但兩次注射之間應**至少相隔 3 天 (超過 72 小時)**。選定新的注射日之後，應持續每週注射一次。

六、可能的副作用

可能有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、食慾減低等。

七、保存方式

1. 本藥需放在原包裝盒內避光冷藏(2-8°C)，不可冷凍！如發生變質或過期，不可再使用。
2. 若有需要，注射筆可放在不超過攝氏30度的避光環境，最多存放14天。

資料來源：

1. 衛生福利部食品藥物管理署. 衛部菌疫輸字第 000978 號. 許可證詳細內容. Retrieved July 19, 2022, from <https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=60000978>
2. 台灣禮來股份有限公司. (2020, May 25). Trulicity-用藥指引-109-05-25. 仿單資料. Retrieved July 19, 2022, from <https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D3.aspx?LicId=60000978>
3. 台灣禮來股份有限公司. (2020, May 25). Trulicity-仿單 revised-109-05-25. 仿單資料. Retrieved July 19, 2022, from <https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D3.aspx?LicId=60000978>
4. 台灣禮來股份有限公司. (2019, June 28). TRULICITY 1.5mg-使用手冊 201905-108-06-28. 仿單資料. Retrieved July 19, 2022, from <https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001D3.aspx?LicId=60000978>