

用藥指導單張

成分名：**Semaglutide**

商品名：**Wegovy soln for inj 1mg/dose, 4mg/pen**

中文名：**週纖達®諾特筆注射劑**

一、作用

肥胖與過重之體重控制，作為低熱量飲食及增加體能活動的輔助療法，

二、用法

1. 每週皮下注射一次，可在一天中的任何時間注射，不論是否進食。
 2. 本藥須由醫師處方，請遵照醫囑使用。
- 詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量及醫師的指示。

三、注意事項

1. 計畫懷孕、已懷孕或哺乳期間，請勿使用此藥。計畫懷孕前至少兩個月應停用週纖達®諾特筆。
2. 本身或家族有甲狀腺髓質癌病史，或罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群的病人，請勿使用。
3. 有糖尿病視網膜病變病史的病人，使用時應特別謹慎，密切監測視網膜病變情況是否惡化。
4. 若注射部位有紅、疼痛、腫塊，應避免注射此位置。如果症狀仍持續，應告知醫師或藥師。

四、注射操作說明

開始注射前


1. 洗淨雙手，準備週纖達®諾特筆、酒精棉片及盒內附的一個新的無菌針頭。
2. 注射前，檢查注射筆中的溶液是不是「**透明無色**」。
3. 以酒精棉片消毒注射筆「橡皮頂端(紅框處)」及「注射部位皮膚」。



週纖達®諾特筆操作影片

選擇注射部位


1. 將藥物注射到離肚臍至少 5 公分的**肚子(腹部)**或**大腿**中。
2. 由他人協助時可注射於**上臂**。
3. 每週注射部位建議輪替。您可以選擇身體相同區域，但請務必選擇該區域不同的注射部位。




藥品構造



注射步驟

	裝上針頭 (每次注射都應使用新的無菌針頭) 1. 撕下針頭保護封膜，垂直將針頭旋入橡皮頂端轉到固定為止。 2. 移除針頭外蓋收好備用，取下內蓋並丟棄。
	檢查排空 (每次使用新的注射筆，必須先執行排氣動作) 1. 如果是已經在使用的注射筆，請跳到「設定劑量」步驟。 2. 旋轉劑量鈕，確認排除空氣符號「--」，對齊劑量指示線「<mg」。 3. 針頭朝上並輕敲注射匣，使所有氣泡都能上升至針頭處。 4. 按住給藥按鈕直到劑量指示刻度回到「0」，並對齊劑量指示線「<mg」。 5. 針尖應流出少量藥物液滴，表示您已排氣完成。 備註: 1. 若未見流出液滴，請重複排氣步驟，最多僅能嘗試2次。 2. 若仍未見流出液滴，請更換注射針頭再次排氣步驟。 3. 若仍無液滴，請勿使用該注射筆並諮詢醫護人員。
	設定劑量 1. 旋轉劑量旋鈕，圖示處方劑量(例如:0.25mg)對其劑量指示線時，表示已選擇好劑量。 2. 若轉到「1」，表示劑量為1mg。 !!! 如還沒轉到處方劑量就無法轉動，表示剩餘量已不足該次處方劑量，請回診找醫師評估及開立處方。
	注射 1. 以酒精棉片消毒欲注射部位。 2. 將針頭刺入皮膚中。 3. 按下劑量旋鈕直到劑量視窗顯示「0」為止，然後慢慢數到「6」。 4. 完成後將針頭拔出您的皮膚，針頭尖端有一滴藥物是正常的。這不會影響到治療劑量。 5. 若皮膚見血，以棉片輕輕按住注射部位，勿搓揉。



移除並回收針頭

1. 套回針頭外蓋，反方向旋轉以移除針頭。
2. 廢棄針頭丟入針頭回收罐，交由醫療院所處理。
3. 將**筆蓋套回注射筆**。

五、忘記用藥的處置

1. 如果錯過一劑藥物，應在 **5 天內** 儘快施打。
2. **超過 5 天**，跳過一劑，下一劑按照原訂時程注射。

六、可能的副作用

1. 胃腸副作用，如噁心、腹瀉、便秘、嘔吐。大多數第二劑後腸胃道副作用會逐漸改善。若要改善噁心反胃的反應，建議減少餐點分量、避免油膩食物，或是覺得有飽足感就不再進食。
2. 若腸胃道不良反應持續發生，請立即回診告知醫師。
3. 週纖達®諾特筆注射劑可能造成低血糖，尤其合併使用其他口服磺胺類降血糖藥物、胰島素時，就可能出現低血糖（症狀如：飢餓、發抖、心悸、嗜睡、冒冷汗、視力模糊、眩暈、心跳加快），此時請盡快食用果汁或方糖。嚴重低血糖可能會昏迷意識不清，則不可進食，應立即送醫。

七、保存方式

1. 未使用前，需存放於冰箱冷藏(2-8°C)，請勿冷凍。
2. 開封使用後，可儲存於30°C以下或冷藏(2-8°C)，至多6週。
3. 注射筆使用後，必須套回注射筆蓋，以避免光線照射。

資料來源:

1. 藥品仿單
2. 週纖達®諾特筆 Wegovy 衛教_民眾版